

第14.6章 绵羊附睾炎（绵羊布鲁氏菌）

[*Ovine epididymitis (Brucella ovis)*]

第14.6.1条

总则

诊断试验和疫苗标准见《陆生手册》。

第14.6.2条

无绵羊附睾炎绵羊群

绵羊群如符合以下条件便可视之为无绵羊附睾炎：

- 1) 在官方兽医的监控之下；
- 2) 在过去一年内，所有绵羊均无绵羊附睾炎临床症状；
- 3) 群中所有绵羊均有永久性标识。

如部分或所有公羊接受了免疫接种，该羊群仍应被视为无疫羊群。

第14.6.3条

关于进口种用或饲养用绵羊（去势雄性绵羊除外）的建议

进口国兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明：

- 1) 装运当日无绵羊附睾炎临床症状；
- 2) 来自无绵羊附睾炎羊群；
- 3) 装运前，6月龄以上绵羊在原产地养殖场内隔离饲养了30天，并经绵羊布鲁氏菌检测，结果均为阴性；或
- 4) 动物如来自不符合上述第14.6.2条规定的绵羊群，则应在装运前隔离饲养，并先后接受两次绵羊布鲁氏菌检测，间隔时间为30~60天，且第二次检测于装运前15天内进行，结果均为阴性。

第14.6.4条

关于进口绵羊精液的建议

进口国或地区兽医主管部门应要求出示国际兽医证书，证明：

- 1) 供精动物：
 - a) 采精之日无绵羊附睾炎临床症状；
 - b) 来自无绵羊附睾炎羊群；
 - c) 采精前60天内一直饲养于出口国或地区的养殖场或人工授精中心，且这些场所的所有动物均无绵羊附睾炎；
 - d) 采精前30天内，经绵羊布鲁氏菌检测，结果均为阴性；
- 2) 精液中不含绵羊布鲁氏菌或其他布鲁氏菌抗体。

注：于1982年首次通过。